

POTASA LÍQUIDA K-30

Denominación tipo: MEZCLA DE MICRONUTRIENTES.
Grupo E.2.4 del Reglamento (CE) nº 2003/2003 "ABONO CE"

Descripción del Producto

POTASA LÍQUIDA K-30 es un fertilizante líquido de alta concentración en potasio desarrollado para su empleo mediante pulverización foliar y/o fertirrigación. Está indicado, en general, para prevenir y corregir estados carenciales debido a desequilibrios en la asimilación del potasio en cualquier momento del ciclo biológico del cultivo. Su aplicación está especialmente indicada durante los momentos de mayor consumo del cultivo, como la etapa de engorde y maduración para mejorar el aspecto, calidad y peso de los frutos.



Precauciones Generales

POTASA LÍQUIDA K-30 es un producto estable y puede ser almacenado en su envase original y bajo condiciones normales de almacenamiento (lugar oscuro, seco y alejado de temperaturas extremas, entre 5-35°C) por un mínimo de 2 años. Es compatible con los abonos y productos fitosanitarios normalmente utilizados. No mezclar con aceite ni con productos de pH muy ácido. **En caso de duda, realizar una prueba previa de compatibilidad.**

Composición y Especificaciones

POTASIO (K ₂ O) SOLUBLE EN AGUA	30 % p.p.
NITRÓGENO (N) TOTAL	3 % p.p.
NITRÓGENO (N) URÉICO	3 % p.p.
AGENTE QUELANTE: EDTA	1 % p.p.
pH (SOLUCIÓN 1% AGUA)	12,5
DENSIDAD (a 20 ° C)	1,5 g/cm ³

Dosis y Modo de Empleo

POTASA LÍQUIDA K-30 puede ser empleado en cualquier época y en todo tipo de cultivos, tanto en aplicación foliar como radicular. **Aplicación foliar:** Como **corrector de carencias** dosis de 200-300 cc/hl. Se aconseja aplicar especialmente durante la fase de crecimiento del fruto y comienzo de la maduración. Como **complemento del abonado potásico** para favorecer la coloración, propiedades organolépticas, etc. de los frutos se recomienda aplicar 2-3 semanas antes del inicio del cambio de color en cítricos, en el periodo de mayor crecimiento del fruto en frutales y a partir del cuajado del fruto en hortalizas, a una dosis media de 100-250 cc/hl. En olivo hasta 300 cc/hl. El tratamiento foliar no debe realizarse a horas de alta insolación.

En fertirrigación de 0,5-1 l/hl de agua de riego y gasto de 10-12 l/ha y riego hasta completar 40-60 l/ha y ciclo cada 10-15 días, cantidad que se ajustará de acuerdo con el plan de abonado establecido y la evolución del cultivo.